

## ¡Alto a la degradación de resultados técnicos!

**M. Montagne**

*(L'Eleveur de lapins, 1985 (5): 49-51)*

El conjunto de los resultados obtenidos por los distintos servicios de gestión técnica cunícola, indican una degradación de los resultados medios de los conejares. ¿Acaso las razones de esta situación hay que atribuirla a un descenso del estado sanitario?. Es evidente que podríamos centrar las causas de ello en los reproductores, el pienso, el agua, etc., pero probablemente las causas se centran en el mal manejo, en una degradación en la higiene (limpieza y desinfección), poca diligencia en eliminar los reproductores y la inferior calidad de las reposiciones.

### **La limpieza y desinfección**

Todo lo referente al conejar debe cuidarse con gran esmero higiénico, siendo preciso limpiar y desinfectar con regularidad.

Tanto en la maternidad como en el engorde, las jaulas deben ser lavadas, a ser posible retiradas del local y sumergidas en un depósito con agua que contenga una sustancia desincrustante, en tal caso, el lavado es más fácil, tanto si se hace con el cepillo, como si se emplea el agua a presión. Lo mismo diríamos para los nidales, si bien los contruidos en madera no se dejarán largo tiempo en líquido, debiéndose disponer de unidades de recambio. Cuando los nidos están perfectamente lavados es deseable rociarlos con un desinfectante bactericida, virucida, fungicida, dejándoseles secar antes de su utilización.

Con una renovación media de las conejas

cada seis meses, una jaula de reproducción será lavada y desinfectada dos veces anuales, lo cual es realmente escaso.

Es importante la retirada regular y constante de las incrustaciones. También es muy importante la limpieza de los circuitos del agua —depósitos, tubos y bebederos.

El conejar debe estar perfectamente limpio y saneado, sin olvidar la higiene de las dependencias del almacén.

El aire del ambiente puede ser también saneado; hay cierto número de productos desinfectantes que pueden ser pulverizados atmosféricamente en presencia de animales con buenos resultados, especialmente en los casos de alteraciones respiratorias crónicas, pulverización que podría efectuarse una vez por semana.

Por lo que se refiere a la higiene del cunicultor, es preciso cambiarse regularmente la bata de trabajo, por cuanto puede constituirse en un vector de contagio de enfermedades.

### **La renovación de hembras**

La renovación adecuada es fundamental para el sostenimiento de unos resultados adecuados. Es preciso renovar los reproductores en cantidad y en calidad: no se gana nada retirando conejas enfermas, si las que se reponen no están perfectamente sanas. La selección de futuros reproductores es trascendental y debe merecer dos objetivos: selección genética y selección sanitaria.

Para un conejar medio, una previsión de

(Continúa en página 209)